



《予防接種の対象年齢および接種回数》



予防接種 種 類		対象年齢 (月齢)	接種条件	接種回数	推奨年齢 (月齢) ・ 推奨接種間隔など
定期予 防 接 種	BCG	1 歳未満		1 回	5～8 か月
	五種 混合	2 か月～ 90 ヲ月		初回 3 回 追加 1 回	生後 2 か月～1 歳までに初回 接種 3 回を終え、3 回目から 1 年～1 年半の間に追加接種
	麻しん 風しん	1 歳～2 歳未満		1 回	
		就学前 1 年間		1 回	
	小児用 肺炎 球菌	2 か月～ 5 歳未満	2 か月～7 か月未満 に開始した場合	初回 3 回 追加 1 回	1 回目接種後 27 日以上あけ て 2 回目、2 回目接種後 27 日以上の間隔をあけて 3 回 目、3 回目接種後、60 日以 上の間隔をおいた後で生後 12 か月齢後に追加接種
			7 か月～12 か月未 満	初回 2 回 追加 1 回	1 回目接種後 27 日以上の間 隔をあけ 2 回目接種 2 回目の接種を受けてから 60 日以上の間隔をあけ 12 か月齢後に追加接種
			1 歳以上～2 歳未満	2 回	1 回目接種後 60 日以上の間 隔をあけ 2 回目
			2 歳以上～5 歳未満	1 回	
	水痘	1 歳～3 歳未満		2 回	1 回目の接種から 6 か月か ら 12 か月まで経過した時期 に 2 回目の接種を行う。
	日本 脳炎	6 か月～90 か月	推奨月齢：3 歳・4 歳	初回 3 回	20 歳以下の全ての方が接種 可能。(ただし 7 歳 6 ヲ月～ 9 歳までは定期接種対象外)
		9 歳～13 歳未満	推奨月齢：9 歳	追加 1 回	
	B 型 肝炎	2 カ月 ～1 歳未満		3 回	1 回目と 2 回目の間隔は 27 日以上あけ、1 回目から 139 日以上間隔をあけて 3 回目を 接種する。
	ロタ	1 価：6 週～24 週 5 価：6 週～32 週		1 価：2 回 5 価：3 回	接種と接種の感覚を 27 日以 上あけて、接種する。腸重積 の好発時期を避けるため、出 生 14 週 6 日までに完了す ることが望ましい。
任 意	おた ふく	1 歳～2 歳未満		2 回	
		就学前 1 年間			

＜連絡先＞

厚沢部町保健福祉センター 保健福祉課健康増進係 保健師 TEL：0139-64-3319